



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

**Ταχ. Διεύθυνση : Παραλιακή οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου  
Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο  
Τηλ.: 2752026241  
Πληροφορίες: Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  
23**

**Αρ. Δελτίου 17 / 18-9-**

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ**

**1. ΨΩΡΕΣ**

**Οδηγίες:** Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στις εξής ημερομηνίες:

- α) Πρώιμες περιοχές: Με την λήψη του δελτίου  
β) Όψιμες περιοχές: Από 20 ως 24 Σεπτέμβρη.**

**Φυτ/κά προϊόντα:** Επειδή αυτήν την εποχή συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια των κοκκοειδών, περισσότερο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα υπόλοιπα εγκεκριμένα φ.π. που μπορούν να συνδυαστούν με αυτόν.  
Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

**2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

**Οδηγίες:** Να γίνει συνδιασμένη καταπολέμιση με την ψώρα. Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.

**3. ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ - ΚΟΚΚΟΣ (*Coccus hesperidum*)**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να προηγηθεί έλεγχος για την παρουσία του ωφέλιμου αρπακτικού, το οποίο εφόσον υπάρχει, θα ελέγξει τους πληθυσμούς της Ισέρυας.  
Όπου απαιτείται επέμβαση, αυτή να πραγματοποιηθεί και για τους δυο εχθρούς στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην ψώρα.

#### **4. ΘΡΙΠΕΣ**

**Οδηγίες:** Συνδυασμένη καταπολέμηση με την ψώρα σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές.

#### **5. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Διαπιστώσεις:** Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το έντομο και η πίεση των πληθυσμών μεγάλη.

**Οδηγίες:**

1. Όσοι επιλέξουν τις παγίδες ως μέσο καταπολέμησης του εντόμου, να κάνουν άμεσα την ανάρτηση στις πρώιμες ποικιλίες των εσπεριδοειδών και στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.
2. Όσοι επιλέξουν ψεκασμούς κάλυψης, αυτοί να ξεκινήσουν στο τέλος του Σεπτεμβρίου.

Σε ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών, να συνεχιστεί η προστασία.

#### **6. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ - ΑΚΑΡΕΑ (*Aculuspelecassi*, *AceriaSheldoni*)**

**Οδηγίες:** Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες. Επέμβαση για τους τετρανύχους χρειάζεται σε οπωρώνες που διαπιστώνετε κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων. Για τα ακάρεα να γίνει καταπολέμηση όπου διαπιστώνονται προσβολές.

#### **7. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ**

**Διαπιστώσεις:** Στα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια να συνεχιστεί η προστασία από τον φυλλοκνίστη.

**Οδηγίες:** Για τον Εριώδη Αλευρώδη δεν απαιτείται επέμβαση. Σε περιπτώσεις που έχετε προσβολή, μπορείτε να στέλνετε δείγματα στην υπηρεσία μας για τον έλεγχο του παρασιτισμού και παροχή οδηγιών.

## ΚΟΚΟΕΙΔΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ



Chrysomphalus sp.



Chrysomphalus sp.



Κόκκινη ψώρα



Μυτιλόμορφη ψώρα



Parlatoria ziziphii



Pulvinaria



Κόκκος



Κηροπλάστης



Ισέρυα

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- :
1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ &

α.α.

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ